

# آرٹھرائٹس کے مريضوں کے لئے معلوماتی کتابچہ

جوڑوں کے درد کی دوائی: ہائڈروکلوروکوئین:

## HYDROXYCHLOROQUINE

مجھے یہ HYDROXYCHLOROQUINE کیوں دی جا رہی ہے؟

اگرچہ یہ دوائی ملیریا (MALARIA) کے علاج کے لئے استعمال کی جاتی ہے مگر یہ ARTHRITIS اور SLE میں بھی اثر دکھاتی ہے۔ یہ سونام کم کر سکتی ہے جس سے درد اور جوڑوں کی اکٹھتگی کم ہو جاتی ہے اور (SLE) کا (RASH) بھی بہتر کرنے میں مدد کرتی ہے۔

کب دوائی استعمال کرنی چاہیے؟

آپ یہ دوائی کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد استعمال کریں۔

کتنی خوراک استعمال کروں؟

آپ کا ڈاکٹر اس بارے میں آپ کو بتائے گا۔ عام طور پر ممل خوراک جیسے دو گلے HYDROXYCHLOROQUINE 400mg یعنی 400mg شروع کی جاتی ہے اور بعد میں آپ کا ڈاکٹر سے کم کر سکتا ہے (یعنی ایک گلے HYDROXYCHLOROQUINE 200mg) پچھر یعنی 200mg HYDROXYCHLOROQUINE ہفتے میں دو مرتبہ لیتے ہیں۔ اگر ان کی بیماری قابو میں ہے۔

HYDROXYCHLOROQUINE درد کی دوائی ہے۔ اس لئے اگر آپ پہلے سے درد کی عام دوائیاں لے رہے ہیں تو انھیں جاری رکھیں جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو منع نہ کرے۔

یہ دوائی اثر دکھانے میں کتنا وقت لے گی؟

HYDROXYCHLOROQUINE فوراً اثر نہیں کرتی۔ عموماً بارہ ہفتے تک اثر محسوس ہونا شروع ہوتا ہے۔

مضر اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟

مضر اثرات عام نہیں ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں میں جلد پردھنی، بدھنسی، دست، سر درد اور نظر میں ڈھنڈ لایا ہو سکتا ہے۔ جب کہ بعض اوقات آنکھ کے پچھلے حصے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔

مجھے کوئی خاص ٹیسٹ کی ضرورت تو نہیں؟

یہ دوائی شروع کرنے سے پہلے آپ کا ڈاکٹر آپ کے خون کا ٹیسٹ کرو سکتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ آپ کا جگر اور گردے صحیح کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو متواتر خون کے ٹیسٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ کا ڈاکٹر آپ سے آپ کی بینائی کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے اور آپ کی نظر چیک بھی کر سکتا ہے اور اگر صحیح ہو تو پھر سالانہ آنکھ کا معائنہ کرے گا۔

کیا میں دوسری دوائیاں ساتھ لے سکتا ہوں؟

Zyadat do dawa iyar HYDROXYCHLOROQUINE کے ساتھ لینا محفوظ ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی تیسی دوائی شروع کر رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر کو ضرور بتائیں کہ

آپ اس دوائی پر ہیں۔ بد نہ سمجھی کے لئے پچھے دوائیاں یا جو عام دستیاب دوائیاں ہیں وہ HYDROXYCHLOROQUINE کو جنم میں جذب ہونے سے روکتی ہیں۔ اس لئے جب بھی کوئی ایسی دوائی لیں تو اپنے ڈاکٹر یا دوسرا ساز سے مشورہ کریں۔

## کیا HYDROXYCHLOROQUINE حمل (PREGNANCY) کو اثر کرتی ہے؟

HYDROXYCHLOROQUINE عام طور پر حمل کے دوران نہیں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ بچے کو نقصان پہنچاسکتی ہے۔ اگر آپ بچہ چاہتے ہیں یا بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔

## کیا میں شراب پی سکتا ہوں؟

اگر آپ HYDROXYCHLOROQUINE لے رہے ہیں تو کوئی خاص وجہ نہیں ہے کہ آپ شراب سے اجتناب کریں۔

## مزید معلومات کہاں سے حاصل کروں؟

اپنے ڈاکٹر اور دوسرا ساز سے رابطہ کریں

تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں