

آر تھر آئٹس کے مريضوں کے لئے معلوماتی کتابچہ

جوڑوں کے درد کی دوائی INFliximab

انٹنی TNF ادویات دوسم کی ہیں جو REMICADE کے نام سے دستیاب ہے۔ INFLIXIMAB اور بازار میں ARTHRITIS کے مريضوں میں ایک پروٹین ہے کہتے ہیں TNF میں خون اور جوڑوں میں وافر مقدار میں موجود ہوتی ہے جو سو جن پیدا کرتی ہے ANTI-TNF ادویات یا اثر رک्तی ہیں۔ اس طرح یہ ادویات RHEUMATOID ARTHRITIS کے مريضوں میں کار آمد ثابت ہوتی ہیں۔

دوائی کیوں دی جاتی ہے؟

INFLIXIMAB کے مريضوں کے لئے دستیاب ہے۔ یہ دوائی صرف اس صورت میں استعمال کی جاتی ہے اگر ACTIVE RHEUMATOID ARTHRITIS ہوا اور آپ نے METHOTREXATE اور دوسرا دوائیاں جیسے PENICILLAMINE اور GOLD INJECTION SULPHASALAZINE استعمال کر چکے ہیں۔ یہ اس صورت میں بھی دی جاسکتی ہے اگر باقی ادویات نہ استعمال کی جاسکیں صرف جوڑوں کے درد کے ماہر کنسلنٹ ہی آپ کو دے سکتا ہے۔

یہ دوائی ان صورتوں میں نہیں دی جاتی اگر

* آپ کو ACTIVE RHEUMATOID ARTHRITIS نہیں۔

* آپ نے STANDARD علاج نہیں استعمال کیا۔

* آپ کو حمل (PREGNANT) ہے یا بچے کو دودھ پلار ہی ہیں۔

* آپ کو کوئی بیماری ہے (INFECTION)

آپ کا ڈاکٹر ہو سکتا ہے INFLIXIMAB نے کیونکہ

* آپ کوئی بی تھی

* آپ کو بار بار بیماری لاقن ہے

* آپ کو سرطان ہے (CANCER)

کتنی اور کب دوائی استعمال کرنی چاہیے؟

INFLIXIMAB اگر میں دوائی کے طور پر دی جاتی ہے (یعنی ڈرپ کے ذریعہ) آپ کو یہ دوائی لینے کے لئے ہر دفعہ ہپٹال جانا پڑے گا۔ یہ دوائی دو گھنٹوں میں دی جاتی ہے اور مزید ایک یادو گھنٹے کے وقت کے بعد دوسری چار گھنٹوں بعد تیری خوار کے بعد ہر آٹھ گھنٹوں بعد یہ ٹیکہ مسلسل دیا جائے گا۔

میں کب بہتر محسوس کروں گا؟

اگر INFLIXIMAB نے آپ پارٹ کیا تو آپ دوسرے بارہ گھنٹوں میں بہتر محسوس کریں گے۔

مضار اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟

INFLIXIMAB سے نزلہ، زکمان، ناک بند، سر درد، چکر، RASH، پیٹ میں درد یا ہضمی ہو سکتی ہے۔ اگر بخار ہو گلہ خراب ہو یا کوئی اور بیماری ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر یا جوڑوں کے درد کی ماہنری سے رابطہ کریں۔

بعض اوقات INFLIXIMAB سے لوگوں کو الرجی ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ ہی ہو تو دوائی بند کرنی پڑے گی۔

کبھی کبھی کچھ لوگوں کو اس دوائی سے ایک بیماری (LUPUS DRUG-INDUCED) کہتے ہیں) ہو جاتی ہے۔ جو عام طور پر معمولی ہوتی ہے۔ ان کی علامات بخار اور جوڑوں میں مزید درد ہے آپ کا جوڑوں کا ڈاکٹر خون کے ٹیسٹ کے ذریعے اسے ٹیسٹ کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ہو جائے تو یہ دوائی بند کر دی جائے اور یہ بیماری خود بخود غائب ہو جائے گی۔ چونکہ یہ دوائی نئی ہے اس لئے اسکے درس مندرجہ بھی معلوم نہیں ہیں۔

اگر میں INFILIXIMAB لوں تو کوئی خاص ٹیسٹ کی ضرورت ہے؟

دوائی شروع کرنے سے پہلے آپ کی چھاتی کا ایکسرے اور خون کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے اور پھر دوائی کو جانچنے کے لئے مزید خون کے ٹیسٹ کروائے جائیں گے۔
کیا میں دوسری دوائیاں بھی اس دوائی کے ساتھ استعمال کر سکتا ہوں؟

زیادہ تر لوگ جنہیں INFILIXIMAB دی جا رہی ہے انہیں METHOTREXATE بھی دی جاتی ہے۔ اگر آپ METHOTREXATE لے رہے ہیں تو NSAIDs لیتے وقت خاص احتیاط کریں۔ آپ یہ صرف تب لے سکتے ہیں جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو استعمال کرنے کی اجازت دے۔ اگر آپ کوئی نئی دوائی لیں یا کوئی ڈاکٹر آپ کوئی دوائی شروع کروائے تو آپ کو INFILIXIMAB کے بارے میں ضرور آپ کو استعمال کرنے سے نہ روکے۔ INFILIXIMAB درد کی دوائی نہیں ہے اس لئے اگر آپ درد کی دوائی لے رہے ہیں تو وہ جاری رکھیں جب تک کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو استعمال کرنے سے نہ روکے۔ کوئی بھی دوائی جو بازار میں عام دستیاب ہو وہ اپنے ڈاکٹر، جوڑوں کے درد کی ماہر نر سیاہ دوسرا ساز کے مشورہ کے بغیر نہ استعمال کریں۔

کیا میں شراب پینا جاری رکھ سکتا ہوں؟

اگر آپ INFILIXIMAB استعمال کر رہے ہیں تو شراب پی سکتے ہیں مگر کیونکہ یہ دوائی اکٹھتی ہے اور شراب اور METHOTREXATE دونوں جگہ پر اثر کرتی ہیں اس لئے کم مقدار میں شراب استعمال کرنی چاہیے۔

اگر میں بچہ چاہتی ہوں تو؟

INFILIXIMAB کا اثر بچہ جو پیٹ میں ہے اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ وہ عورتیں جو بچہ بیدار کر سکتی ہیں انہیں مانع حمل ادویات استعمال کرنی چاہیے۔ اگر وہ INFILIXIMAB لے رہی ہیں اور اگر آپ بچہ بیدار کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں یا مانع حمل ادویات استعمال نہیں کر رہی ہیں تو INFILIXIMAB استعمال نہ کریں۔

اگر آپ INFILIXIMAB لے رہے ہیں تو اس کی آخری خوراک کے کم از کم چھ مہینوں تک تجویز کیا جاتا ہے کہ عورتیں حاملہ ہوں اور مرد بچہ بیدار کریں۔

بچہ کو دودھ پلاسکتی ہوں؟

یہ دوائی میں جاسکتی ہے اور بچہ کو نقصان کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں۔ اس لئے بہتر ہے کہ دودھ نہ پلا یا جائے۔

کیا INFILIXIMAB کسی اور بیماری کے لئے بھی دی جاتی ہے؟

ہاں یہ لوگ جنہیں شدید قسم کی CROHN'S DISEASE (آنت کی بیماری) ہے انہیں دی جاسکتی ہے۔ اور یہ جوڑوں کی ایک اور بیماری ANKYLOSING SPONDYLITIS میں بھی دی جاتی ہے۔

مزید معلومات کہاں سے حاصل کروں؟

اگر آپ کے بارے میں مزید معلومات چاہتے ہیں یا علاج کے بارے میں فرمند ہیں تو اپنے ڈاکٹر، جوڑوں کے درد کی ماہر نر سیاہ دوسرا ساز سے رابط کریں۔ مزید معلومات مندرجہ ذیل ویب سائٹ سے حاصل کریں۔ www.remicade.com

تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں