

آرٹھرائٹس کے مرضوں کے لئے معلوماتی کتابچہ

جوڑوں کے درد کی دوائی: NSAIDS

جوڑوں کے درد کے لئے بہت سے NSAIDS موجود ہیں جن میں ایسپرین، آنپروپرفین، نپروکسین، اندومیتھاسن، ڈکلوفینک، کیٹوپروفین، شامل ہیں۔ NSAIDS کے لفظ کے معنی یہ ہیں کہ یہ دوائی درکم کرتی ہے اور جوڑوں کی اکڑاہٹ کم کرتی ہے مگر اس دوائی میں STEROIDS استعمال نہیں ہوتے۔

دوائی کیوں دی جا رہی ہے؟

NSAIDS بہت کارآمد ہیں کیونکہ یہ دردا اور اکڑاہٹ دونوں کم کرتی ہے۔ اس دوائی کا بیماری پر لمبے عرصے کے لئے کوئی اثر نہیں۔ عموماً عام درد کی دوائیوں کے ساتھ استعمال کئے جاتے ہیں۔

کب اور کیسے دوائی استعمال کروں؟

یہ کھانے کے ساتھ اور کھانے کے فوراً بعد یا جیسے آپ کا ڈاکٹر بتائے استعمال کریں۔ ان گولیوں کے ساتھ آپ کو ایک گلاں پالی بھی بینا چاہیے۔ ان میں سے بعض دوائیاں دن میں ایک مرتبہ استعمال کی جاتی ہیں (خاص طور پر جو آہستہ اثر کرنے والی یعنی SLOW-RELEASE متواتر اثر کرنے والی RETARD SUSTAINED-RELEASE گولیاں شامل ہیں) دوسری گولیاں دو یا تین مرتبہ دن میں استعمال کی جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ گولی یا کپسول کی صورت میں استعمال کی جاتی ہے۔ البتہ بعض شربت (مالٹ) یا کریم کی صورت میں بھی استعمال ہوتی ہے۔

کتنی خوراک استعمال کرنی چاہیے؟

اس کے بارے میں آپ کو ڈاکٹر بتائے گا۔ عام طور پر کم خوراک کے ساتھ یہ دوائی شروع کی جاتی ہے اور پھر حسب ضرورت بڑھادی جاتی ہے۔

یہ دوائی کتنی دیر میں اثر دکھاتی ہے؟

NSAIDS کچھ گھنٹوں میں اثر دکھاتے ہیں البتہ زیادہ سے زیادہ فائدہ دو ہفتہ تک محسوس ہوتا ہے۔

مضراً ثابت کیا ہو سکتے ہیں؟

مضراً ثابت میں بد-ہضمی، معدہ کی درد، معدہ کی جلن، RASH، سر درد اور سانس کا پھولنا ہے۔ اگر آپ کوئی نئے اثرات مرتب ہوں تو دوائی بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا جوڑوں کے درد کی نرس سے فوراً رابطہ کریں۔ NSAIDS اگر زیادہ عرصہ کے لئے استعمال کئے جائیں یا زیادہ خوراک اس استعمال کی جائے تو معدہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہاں سے خون بھی نکل سکتا ہے۔ اس لئے انہیں احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اور صرف تب جاری رکھیں اگر یہ فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو سہلے بد-ہضمی کامعده کے اسرکی شکایت ہے تو ان کو استعمال کریں۔ اگر آپ کو HIGH ASTHMA ہے گردد کا کوئی مسئلہ ہے یا دل کی بیماری ہے WARFARIN خون پتلہ کرنے والی گولی لیتے ہیں تو اس کو استعمال کرنا دشمندی نہیں۔ کچھ ڈاکٹر صاحبان اس کے مرضراً ثابت سے بچنے کے لئے کچھ اور دوائی جیسے PROTON-PUMP INHIBITORS استعمال کرتے ہیں۔ (جن میں MISOPROSTOL اور Lansoprazole یا کوئی اور شامل ہیں) اگر آپ COX-2-SPECIFIC NSAID استعمال کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو مندرجہ ذیل معلومات پڑھیں۔

COX-2-SPECIFIC NSAIDS کے مزید مضراً ثابت کیا ہو سکتے ہیں؟

COX-2-SPECIFIC NSAIDS دوائیوں کی وقتم ہے جو COX-2 SELECTIVE NSAIDS، COX-2 INHIBITORS اور COX-2-SELECTIVE NSAIDS کے ناموں سے جانی جاتی ہیں۔ ان میں روکیکسپ (VIOXX)، سیلیکوکسپ (CELEBREX)، ویلڈیکسپ (BEXTRA)، اور ایٹوریکسپ (ARCOXIA) شامل ہیں۔ ان کا کام عام NSAIDS کی طرح ہے مگر یہ مضراً ثابت جیسے معدہ کی جلن، معدہ کا درد اور بد-ہضمی کم کرتے ہیں۔ البتہ حال ہی ہے COX-2-SPECIFIC NSAIDS کا تعلق دل کے دورہ اور فائخ سے جوڑا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے BEXTRA اور VIOXX نے اپنی دوائیاں خود ہی میل کرنا بند کر دی ہے۔ اگر آپ کو دل کی بیماری ہے یا دل کا دورہ پڑ چکا ہے تو COX-2-SPECIFIC NSAIDS نے استعمال کریں۔ اگر آپ کو ہائی بلڈ پریش کا مسئلہ ہے جو دوائیوں سے کثروں نہیں تو آپ ETORICOXIB نے استعمال کریں۔ ڈاکٹر حضرات کو بھی یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہائی بلڈ پریش، کولیٹرول کا زیادہ ہونا، شوگر (ذیا بیٹس)، سگریٹ پینا یا کوئی ایسی بیماری جس سے دل کے دورہ پڑنے کا خطرہ ہو اُن میں یہ دوائی نہ استعمال کی جائے۔ جن لوگوں میں استعمال کی بھی جائے وہ کم عرصے کے لئے اور کم سے کم خوراک استعمال کی جائے۔ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے یادوائی کے بارے میں تشویش ہو تو ڈاکٹر یا جوڑوں کے درد کی ماہر نرس سے رابطہ کریں۔

اگر میں یہ دوائی استعمال کروں تو مجھے کوئی مخصوص ٹیسٹ کی ضرورت ہے؟

عام طور پر خون کے ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں تاہم بعض صورتوں میں یہ کروائے جاسکتے ہیں۔

کیا میں دوسری دوائیاں ساتھ استعمال کر سکتا ہوں؟

کچھ دوائیاں جیسے WARFARIN کا استعمال شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں اور کوئی بھی نئی دوائی شروع کریں تو ڈاکٹر کو بتائیں کہ میں NSAIDS استعمال کر رہا ہوں۔

اگر آپ کو ایسپرین سے المرجی ہے تو NSAIDS نہ استعمال کریں۔ کچھ جیسے NSAIDS ایسپرین اور آب پروفین عام دستیاب ہیں۔ ایک سے زیادہ NSAIDS ایک ہی وقت میں استعمال کرنا غلمندی نہیں۔ بازار میں عام دستیاب دوائیاں بھی استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر، دوا ساز یا جوڑوں کے درد کی ماہر نزس سے مشورہ ضرور کریں۔

کیا میں شراب پی سکتا ہوں؟

بھی ہاں مگر شراب اور NSAIDS دونوں معدہ خراب کرتے ہیں۔

کیا یہ دوائی حمل (PREGNANCY) اور انسان کی افزائش نسل (FERTILITY) کی صلاحیت را ثابت نہ ہو سکتی ہے؟

عام طور پر NSAIDS حمل کے دوران نہیں استعمال کئے جاتے۔ اگر آپ بچہ چاہتے ہیں یا اس دوائی کے استعمال کے دوران حمل ٹھہر جائے تو اپنے ڈاکٹر یا جوڑوں کے درد کی نزس سے رابط کریں۔ حال

ہی میں کچھ ریسچ کے مطابق اگر NSAIDS حمل کے دوران استعمال کئے جائیں تو ان سے بچ پڑائے ہونے (MISCARRIAGE) کا خطرہ ہوتا ہے PARACETAMOL کا یا اثر نہیں ہے۔

کیا میں بچے کو اپنادوہ پلاسکتی ہوں؟

کچھ NSAIDS بچے کو دودھ پلانے کے دوران نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ ڈاکٹر سے اس بارے میں مشورہ کریں۔

مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے یا کسی بات پر تشویش ہو تو اپنے ڈاکٹر، دوا ساز یا جوڑوں کے درد کی ماہر نزس سے رابط کریں

تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں